

Informe de consulta

Hoy su hijo recibió un servicio dental detallado a continuación y marcado con una "X" y/o un número para mostrar cuántos de esos servicios se llevaron a cabo. Revise el servicio que se realizó y las pautas posoperatorias para dicho procedimiento.

Sellador: se colocó un sellador en ciertos dientes para ayudar a reducir la posibilidad de formación de caries. El sellador es duro y su hijo debe evitar o limitar los alimentos pegajosos o masticables para permitir que dure más en el diente. Su hijo puede comer y beber en estos momentos.

Empaste blanco: se colocó un empaste blanco (resina compuesta) en un diente específico para tratar una caries existente o para reparar un diente roto. Si se trata de una muela o diente trasero, asegúrese de que su hijo use hilo dental. Si se trata de un diente frontal, su hijo debe tener mucho cuidado con este diente y NO usarlo para morder alimentos porque puede romperse y ser necesario reemplazarlo.

Empaste de plata: se colocó un empaste de plata (amalgama) en un diente específico para tratar una caries existente o para reparar un diente roto. Asegúrese de que su hijo use hilo dental y ayúdele a cepillarse para evitar futuras caries.

Corona de plata: se colocó una corona de plata a su hijo para cubrir y mantener unida la corona del diente, el cual tenía o una gran cantidad de caries o un empaste roto o un tratamiento de nervio realizado que requerían la colocación de dicha corona. La corona está cementada, por lo que su hijo debe evitar los alimentos pegajosos o masticables que puedan hacer que la corona se desprenda.

Tratamiento de nervio: se realizó un tratamiento de nervio (pulpotomía) en un diente que tenía una caries muy cercana al nervio. Esto se hizo para aliviar el dolor o para prevenir el dolor y/o la infección en el futuro.

Extracción: se necesitó extraer un diente porque, o bien estaba infectado o no se podía restaurar, bloqueaba el crecimiento de un diente adulto, el ortodontista pedía que se extrajera o por cualquier otra razón que requiriera la extracción del diente. Que su hijo **NO UTILICE PAJITAS/POPOTES/SORBETES** ni coma ningún alimento que sea más pequeño, duro o crujiente que pueda incrustarse en el área de donde se extrajo el diente. Debe mantener la gasa en la boca hasta que regrese a casa.

Mantenedor de espacio: se colocó un mantenedor de espacio o espaciador para guardar espacio para el diente adulto que crecerá más adelante. Su hijo no debe jugar con el espaciador ni jalarlo o tirar de él. Debe evitar alimentos pegajosos y masticables que puedan hacer que el mantenedor de espacio se afloje o se caiga.

Otros servicios:


Informe de consulta

¿ANESTESIA LOCAL?

SÍ

NO

Revise la imagen de abajo. Las zonas rodeadas con un círculo indican dónde se anestesió a su hijo.



En caso afirmativo, su hijo recibió anestesia local en las zonas rodeadas con un círculo en la imagen de la izquierda.

VIGILE de cerca a su hijo durante las próximas 2 horas, ya que el entumecimiento puede causar que se muerda el labio, la mejilla o la lengua.

HAGA QUE LLEVE una dieta blanda durante el resto del día.

En caso negativo, su hijo no tiene restricciones en la dieta.

Esta noche ayude a su hijo a cepillarse y a usar el hilo dental.

OTROS ASPECTOS DE INTERÉS Y RECOMENDACIONES

FIRMA DEL DOCTOR/A:

FECHA: